

ВАРФАРИН И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА

Многим людям, страдающим мерцательной аритмией, для «разжижения» крови и снижения риска инсульта рекомендуется прием варфарина.

Варфарин – это очень эффективный лекарственный препарат, требующий, однако, регулярного наблюдения для того, чтобы определить, насколько сильно он «разжижает» кровь. Препарат работает, воздействуя на способность печени использовать витамин К, получаемый из нашей пищи. Многие другие лекарственные препараты также разрушаются печенью и могут повлиять на способность варфарина разжижать кровь. В связи с этим лекарства могут как усилить эффект варфарина (что потребует снижения его дозы), так и сделать варфарин менее эффективным, и его дозу придется увеличивать.

Если варфарин принимают вместе с другими лекарственными препаратами, влияющими на его эффективность, в течение длительного времени, то никаких сложностей при этом не возникает. Однако в такие моменты, когда прием этих лекарств только начинается или меняется их доза, требуется увеличить частоту наблюдения за МНО.

К лекарственным препаратам, **увеличивающим** эффект варфарина, относятся:

- **Амиодарон**

Антиаритмический препарат

- **Аспирин**

Болеутоляющее средство

- **Аллопуринол**

Используется при подагре

- **Ампициллин**

Антибиотик

- **Аторвастатин**

Гиполипидемическое средство

- **Целекоксиб**

Противовоспалительное болеутоляющее средство

- **Цефалексин**

Антибиотик

- **Циметидин**

Средство от расстройства пищеварения и для заживления язвы желудка

- **Циталопрам**

Антидепрессант

- **Ципрофлоксацин**

Антибиотик

- **Кларитромицин**

Антибиотик

- **Клопидогрель**

Антитромбоцитарное средство

- **Клюквенный сок**

Напиток

- **Дексаметазон**

Стероид (только в больших дозах)

- **Диклофенак**

Противовоспалительное болеутоляющее средство

- **Дипиридамол**

Антитромбоцитарное средство

- **Дисульфирам**

Используется при лечении злоупотребления алкоголем

- **Энтакапон**

Используется при болезни Паркинсона

- **Эритромицин**

Антибиотик

- **Эзомепразол**

Средство от расстройства пищеварения и для заживления язвы желудка



- **Этодолак**
Противовоспалительное
болеутоляющее средство
- **Эзетимиб**
Гиполипидемическое средство
- **Флуконазол**
Противогрибковое средство для приема
внутри
- **Флутамид**
Используется при раке предстательной
железы
- **Флуоксетин**
Антидепрессант
- **Глюкозамин**
Биодобавка при болях в суставах
- **Ибупрофен**
Противовоспалительное
болеутоляющее средство
- **Итраконазол**
Противогрибковое средство для приема
внутри
- **Кетоконазол**
Противогрибковое средство для приема
внутри
- **Левотироксин**
Препарат гормонов щитовидной железы
- **Мефенамовая кислота**
Противовоспалительное
болеутоляющее средство, также
используется при менструальной боли
- **Мелоксикам**
Противовоспалительное
болеутоляющее средство
- **Метронидазол**
Антибиотик
- **Миконазол**
Противогрибковое средство для приема
внутри или местно
- **Миртазепин**
Антидепрессант
- **Неомицин**
Антибиотик

- **Норфлоксацин**
Антибиотик
- **Омепразол**
Средство от расстройства пищеварения
и для заживления язвы желудка
- **Орлистат**
Средство против ожирения
- **Окситетрациклин**
Антибиотик
- **Пироксикам**
Противовоспалительное
болеутоляющее средство
- **Пантопразол**
Средство от расстройства пищеварения
и для заживления язвы желудка
- **Пароксетин**
Антидепрессант
- **Преднизолон**
Стероид для приема внутрь (только
больших дозах)
- **Прогуанил**
Лечение и профилактика малярии
- **Розувастатин**
Гиполипидемическое средство
- **Сертралин**
Антидепрессант
- **Сибутрамин**
Средство против ожирения
- **Симвастатин**
Гиполипидемическое средство
- **Сиксаксентан**
• **Вальпроат натрия**
Противоэпилептическое средство
- **Сульфипиразон**
Средство от подагры
- **Тамоксифен**
Используется при раке молочной
железы
- **Тетрациклин**
Антибиотик
- **Тестостерон**
Добавка мужского гормона



www.afa-ru.eu

Atrial Fibrillation Association
info@afa-international.org
www.afa-international.org
www.afa-ru.eu

- Трамадал

Болеутоляющее средство

- Триметоприм

Антибиотик

- Венлафаксин

Антидепрессант

Лекарственные препараты, **снижающие** эффект варфарина, включают:

- Барбитураты

Седативное средство

- Бозентан

- Карбамазепин

Противоэпилептическое средство

- Гризеофульвин

Противогрибковое средство для приема внутрь

- Фенитоин

Противоэпилептическое средство

- Примидон

Противоэпилептическое средство

- Рифампицин

Антибиотик

- Зверобой

Антидепрессант (не рекомендуется применять с варфарином)

- Сукральфат

Средство от расстройства пищеварения и для заживления язвы желудка

- Витамин К

Витаминная добавка

ЭТОТ СПИСОК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ, НО ПРИГОДЕН В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДСТВА.

Авторы:

Утверждено:

доктор Мэтью Фей,
врач общей практики
профессор Г.И.Х. Лип, кардиолог
профессор Виталий А. Сулимов,
клинический кардиолог
доктор Ричард Уилльямс,
клинический физиолог
миссис Джейн Мадд, медсестра
Опубликовано: февраль 2011



Affiliated to Arrhythmia Alliance
www.aa-international.org

Для дальнейшей информации обращайтесь в Ассоциацию фибрилляции предсердий
Попечители: профессор А. Джон Камм, доктор Ричард Шиллинг, миссис Джейн Мадд,
медицинская сестра, специализирующаяся на аритмии

©2011 Зарегистрированная благотворительная организация No. 1122442

